

## **Vereinfachte Empfehlungen für die Diagnostik bei Verdacht auf Nebenwirkungen (Angabe der Bedeutung in Klammern):**

*Kompletter Status der Immunzellen* (Pathologie: T 8 Zellen vermindert, Zentrale Memoryzellen fast immer, Terminale Effektor Zellen häufig reduziert. Meist keine allgemeine Immunaktivierung)

*D-Dimere* (fakultativ, ca. in 40 % der Fälle erhöht)

*CRP* (manchmal erhöht)

*Troponin* (erhöht bei Kardialer Beteiligung, dann auch NT-pro-BNP bestimmen)

*Diaminoxidase (DAO)* (sehr häufig übernormal erhöht als Zeichen einer Mastzellaktivierung, bei Histaminintoleranz allerdings inadäquat niedrig)

*Histamin* (bei Mastzellaktivierung meist deutlich erhöht, jedoch wenn DAO erhöht und Histamin normal ist Mastzellaktivierung dennoch möglich)

*Vit. D3* (sollte hochnormal sein)

### Selbstzahlerleistungen

*Agonistische Autoantikörper* (wenn diese seltenen AAK vorhanden sind, ist eine Impfnebenwirkung nahezu bewiesen)

*TH1/Th2 Balance* (bei Nebenwirkungen besteht meist eine TH2 Dominanz)

*VEGF* (wenn erhöht, zusätzlicher Hinweis für Endothelitis)

**Hinweise für eine ausführliche Diagnostik und für therapeutische Hinweise können Sie in der Kurz- und Langversion des Protokolls von Cornea von Ärztinnen und Ärzten kostenlos angefordert werden unter:**

**[info@cornea.org](mailto:info@cornea.org)**